

CAS POUR LESQUELS LA PROPHYLAXIE PAR ANTIBIOTIQUES EST NON RECOMMANDÉE

- radiographies dentaires, injections d'anesthésiques de routine dans un tissu non infecté, perte de dents de lait, pose de plaquettes orthodontiques, saignement dû à un traumatisme des lèvres ou de la muqueuse buccale
- infection virale des voies respiratoires
- incision, drainage ou retrait de fils de suture dans un tissu non infecté
- cathétérisme cardiaque, échographie trans-oesophagienne
- procédures respiratoires (bronchoscopie, laryngoscopie...), gastro-intestinales (gastroscopie, colonoscopie...) ou urologique (cystoscopie...)



Service de cardiologie
pédiatrique

PRÉVENTION DE L'ENDOCARDITE

**Votre enfant est porteur
d'une cardiopathie congénitale.**

Pour lui, les recommandations sont :

- la prophylaxie simple de l'endocardite
- la prophylaxie par antibiotiques

INFORMATIONS

DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE
SERVICE DE CARDIOLOGIE PÉDIATRIQUE

CONTACT : +32 2 764 13 80

Éditeur responsable : Thomas De Nayer / Service de communication

Cliniques universitaires Saint-Luc
Avenue Hippocrate, 10 - 1200 Bruxelles
www.saintluc.be



© Cliniques universitaires Saint-Luc

Vous souhaitez vous inspirer de cette brochure ? Merci de nous contacter préalablement.



Cliniques universitaires
SAINT-LUC
UCL BRUXELLES

SUIVEZ-NOUS SUR



Nom de l'enfant

Cardiopathie

Cardiologue

PROPHYLAXIE SIMPLE DE L'ENDOCARDITE

PAR UNE HYGIÈNE DE VIE OPTIMALE AU QUOTIDIEN :

- **Alimentation saine** et équilibrée, sans grignotages ou sucres inutiles - pas de biberons prolongés (sieste, nuit) contenant des boissons sucrées ou du lait

- **Soins dentaires rigoureux :**
brossage 2x/jour dès l'apparition des premières dents - durant 2 min.
à partir de 2 ans - dentifrice fluoré
adapté à l'âge - examens réguliers des dents par les parents - visites chez le dentiste (minimum 1 fois par an).



- Les **plaies** et infections de la peau doivent être soignées avec la plus **grande attention**
- Les **tatouages** et **piercings** sont **interdits**
- Le traitement par **antibiotiques** est **indispensable** dans le cas **d'infection bactérienne**

PROPHYLAXIE PAR ANTIBIOTIQUES

POUR CERTAINS GESTES DE LA SPHÈRE BUCCO-ORL :

- **Soins dentaires** impliquant la manipulation de la gencive ou de la région péri-apicale de la dent - perforation de la muqueuse orale
- **Chirurgie ORL :** amygdalectomie, adénoïdectomie, biopsie (si infection avérée) ou autres chirurgies.

Situation	Antibiotique 1 heure avant le soin	Dose
Pas d'allergie à la Pénicilline	Amoxicilline ou Ampicilline	50mg/kg (max. 2g)
Allergie à la Pénicilline	Clindamycine	20mg/kg (max 600mg)

- Les procédures invasives sur tissu infecté doivent être couvertes de façon empirique ou spécifique avec un agent actif contre les streptocoques/ staphylocoques (peau) ou les entérocoques (système digestif et urinaire).